

UNITÀ OPERATIVA COMPLESSA di CARDIOLOGIA



Direttore: Dr. Giulio Molon

SCINTIGRAFIA MIOCARDICA

L'esame è programmato	per il giorno	alle ore
, ,		
	per il giorno	alle ore
Verrà eseguito in:		
doppia seduta		
ll giorno dell'appuntament	o recarsi all'Ospedale Sacro Cuore - INC	GRESSO " G " - piano torra
Servizio di Medicina Nucle	•	oresso o - piano terra,
Servizio di Medicina Nucle	eare.	
È necessario presentarsi	con un'impegnativa unica con i segue	enti codici e diciture:

E necessario presentarsi con un'impegnativa unica con i seguenti codici e diciture:

- 92.05.F Tomoscintigrafia miocardica (G-Spet) perfusione stimolo
- 92.05.E Tomoscintigrafia miocardica (G-Spet) di perfusione a riposo

INFORMAZIONI RELATIVE ALL'ESECUZIONE DELLA SCINTIGRAFIA MIOCARDICA

Descrizione dell'esame

Egr. Sig./ra	
il suo medico curante, Dott	

Le ha spiegato che nel suo caso è consigliata l'esecuzione di un'indagine diagnostica denominata Scintigrafia miocardia da sforzo o con stimolo farmacologico.

Lo scopo è quello di valutare il funzionamento del cuore e la capacità di adattarsi ad uno sforzo fisico.

La tecnica utilizzata consente di ottenere delle immagini che evidenziano la distribuzione del sangue alle varie parti del cuore a riposo e durante sforzo e di valutare la sua capacità di contrarsi. La tecnica utilizza composti radioattivi (Tecnezio-99m) che sono somministrati per via venosa e si fissano nel cuore solamente nelle zone che ricevono adeguato apporto sanguigno (quindi non nelle zone infartuate ed ischemiche).

L'esame consiste in due parti: una di pertinenza cardiologia (test da sforzo al cicloergometro o con stimolo farmacologico) ed una di pertinenza medico nucleare che ci permette di ottenere delle immagini del cuore a riposo e sotto sforzo.

Il cicloergometro consiste nell'esecuzione di un monitoraggio elettrocardiografico durante uno sforzo fisico eseguito con carichi di lavoro crescenti su un cicloergometro (bicicletta).

Nell'eventualità di incapacità all'esecuzione di uno sforzo o per altre controindicazioni allo stesso, verrà utilizzata la somministrazione di un farmaco (dipiridamolo, adenosina o dobutamina), per via endovenosa continua a dosi crescenti, secondo un protocollo standardizzato. Questi farmaci agiscono sul suo cuore con meccanismi diversi, ma con obiettivi simili che consistono, analogamente ad uno sforzo, nel far aumentare il lavoro cardiaco.

Dallo sforzo o dall'uso dei farmaci suddetti, possono derivare sintomi quali affaticamento muscolare, difficoltà di respiro, dolori anginosi, variazioni della pressione arteriosa, svenimenti ed eccezionalmente attacchi cardiaci. Nel laboratorio dove sarà eseguito l'esame, sono disponibili attrezzature e personale specializzato in grado di dare una risposta ai rischi derivanti dall'eventuale comparsa delle suddette complicanze.

Nel nostro centro l'esame viene eseguito in regime ambulatoriale, generalmente in due giornate. Nella prima giornata, dopo il test da sforzo, si ottengono immagini del cuore sotto sforzo, nella seconda delle immagini del cuore a riposo.

Il confronto delle immagini ci permette di ottenere informazioni per indirizzare la terapia del caso.

La durata dell'esame è variabile, secondo il protocollo in uso nella seduta, e generalmente si svolgerà in doppia giornata.

L'esame dura circa due ore per ogni giornata.

Preparazione del paziente

- La dose di sostanza radioattiva somministrata è minima; è in ogni modo consigliabile evitare il contatto prolungato con bambini o donne in gravidanza per il giorno dell'esame e per il giorno successivo.
- Le pazienti di sesso femminile ed in età fertile devono accertarsi che non esista la possibilità di una gravidanza in atto; in tal caso l'esame non sarà eseguito.
- Se indicato dal medico curante o dallo specialista cardiologo il paziente deve sospendere nelle 24 ore precedenti l'esame la terapia cardiologica antianginosa (b-bloccanti, calcio antagonisti e nitroderivati), gli antiasmatici (aminofillina, bamifillina) ed alcuni preparati antalgici contenenti caffeina.
- Il paziente deve essere a digiuno (eccetto acqua e farmaci consentiti) dalla mezzanotte. Non devono essere assunti preparati contenenti teofillina da 48 ore prima dell'esame e contenenti caffeina almeno da 12 ore; sono quindi da evitare tè, caffè, cioccolata, e bevande contenenti cola. Solo se l'esame è prenotato nella tarda mattinata (dopo le ore 11.00), è consentita una piccola colazione al mattino presto.
- È necessario portare tutta la documentazione cardiologica in proprio possesso in entrambe le giornate.
- Poiché le immagini del cuore possono essere influenzate dal contenuto della colecisti, è necessario che questa venga svuotata rapidamente prima della registrazione delle immagini. A tale scopo è d'obbligo l'assunzione di pasto colecistocinetico contenente uovo che il paziente dovrà portarsi da casa secondo le indicazioni riportate sotto.

È necessario inoltre che, al fine di valutare controindicazioni all'esame e per prevenire difficoltà e complicanze collegate a situazioni patologiche preesistenti, Lei informi il medico riguardo ad eventuale presenza di:

- cardiomiopatia di grado avanzato
- infarto miocardio recente
- ipotensione od ipertensione arteriosa di grado elevato
- aritmie severe
- angina instabile
- stenosiaortica
- vasculopatia periferica
- · asma bronchiale

Preparazione del pasto colecistocinetico

È necessario, per la buona esecuzione dell'esame, l'assunzione di un pasto colecistocinetico che ha lo scopo di svuotare la colecisti che altrimenti nasconde le immagini del cuore.

A tale scopo il paziente deve portare da casa, in entrambi i giorni, un pasto contenente 2 uova (panino con frittata o uova sode).

Solo per intolleranza all'uovo è consentito un pasto con salumi o formaggio "grasso".

In entrambe le giornate portare anche V2 litro di acqua preferibilmente frizzante.

In mancanza di questa preparazione l'esame non potrà essere eseguito!

Se ha compreso le spiegazioni ed ha deciso di sottoporsi all'esame, La preghiamo di firmare sul retro di questo foglio la sua dichiarazione di consenso.

DICHIARAZIONE DI AVVENUTA INFORMAZIONE E DI CONSENSO ALL'ESECUZIONE DELL'ESAME

(che verrà firmato presso il Servizio di Medicina Nucleare il giorno dell'esame)

essere stat informat in		•		
sulle modalità di esecuzione dell'e In particolare mi sono state illustr con particolare riguardo ai rischi s	ate, anche mediante fo	gli esplicativi, le possibili co	mplicanze legate all'indagine	
Ho comunque appreso che, sulla prevale di gran lunga sui possibili	base della consolidata e		ei risultati attesi dall'indagine	
Preso atto di tutte le informazioni	i, comprese le eventuali	opzioni diagnostiche altern	ative,	
\square acconsall'indagine proposta.	sento	\square non acconsento)	
Dichiaro inoltre di essere a conos necessario modificare la procedu queste circostanze non fosse p necessario. Per quanto a mia conoscenza, dic	ıra concordata o esegui oossibile interpellarmi,	re trattamenti diretti a fron	teggiare tali evenienze; se in	
□ non essere allergico/a a farmad				
🗌 essere allergico/a a				
Data		Firma		
Il medico				
l'esame e l'eventuale ipotesi di ris La sua firma "per presa visione" ir mento dell'esame.		oreso tutte le informazioni e	che acconsente all'espleta-	
Data		Firma		
IN CASO DI PAZIENTE INCAPACE Dati del legale rappresentante (in		di tutto o in parte di autonon	nia decisionale):	
Nome e Cognome (stampatello) _				
Documento	Firma		Data	
INFORMAZIONE DATA AL PAZIEN INTERPRETE: Nome e Cognome (stampatello)				
Documento	Firma			
TESTIMONE: Nome e Cognome (stampatello) _				
Documento			Data	
Revoca del consenso		ento 🗆 nel corso del f	trattamento	
Data	Firma	del paziente		



SCINTIGRAFIA MIOCARDICA

- Se indicato dal medico curante o dal cardiologo sospendere dalle 24 ore precedenti terapia antianginosa (B-bloccanti, calcio antagonisti e nitroderivati) ed alcuni preparati antalgici contenenti caffeina.
- Digiuno dalla mezzanotte (eccetto acqua e farmaci consentiti).
- Non assumere preparati contenenti teofillina da 48 ore prima dell'esame.
- Non assumere sostante contenenti caffeina almeno da 12 ore precedenti (tè, caffè, cioccolata e bevande contenenti cola).
- Se l'esame è prenotato dopo le ore 11.00 è consentita una piccola colazione al mattino presto (prima delle ore 6.00).
- In entrambi i giorni il paziente dovrà portare:
 - panino con frittata (fatta con due uova) o panino con due uova sode.
 Se è intollerante all'uovo può portare panino con salumi o formaggio grasso.
 - mezzo litro di acqua frizzante.
- Portare documentazione cardiologica in possesso.

Dopo l'esame

- Si raccomanda di non avvicinarsi a bambini o donne in gravidanza per 24 ore.