



Premedicazione in caso di Pazienti allergici PROCEDURE IN ELEZIONE

1. Pazienti in grado di assumere farmaci per OS:

- **32 mg** di **METILPREDNISONE** 12 ore prima dell'esame per OS
- **32 mg** di **METILPREDNISONE** 2 ore prima dell'esame per OS
- **10 mg** di **CLOROFENAMINA** 1 ora prima dell'esame IM

2. Pazienti NON in grado di assumere farmaci per OS:

- **200 mg** di **IDROCORTISONE** 13 ore prima dell'esame EV
- **200 mg** di **IDROCORTISONE** 7 ore prima dell'esame EV
- **200 mg** di **IDROCORTISONE** 1 ora prima dell'esame EV
- **10 mg** di **CLOROFENAMINA** 1 ora prima della procedura IM
-

Premedicazione in caso di Pazienti allergici PROCEDURE IN EMERGENZA

- **200 mg** di **IDROCORTISONE** ogni 4 ore (q4h) EV fino al momento dell'esame
- **10 mg** di **CLOROFENAMINA** 1 ora prima della procedura IM
-

N.B. : gli steroidi somministrati per via EV prima di 4 – 6 ore dalla iniezione del mezzo di contrasto non hanno dimostrato di essere efficaci.

Le reazioni a mezzo di contrasto si possono verificare nonostante la premedicazione.

American College of Radiology (ACR) Manual on Contrast Media version 10.2 - 2016

Prevenzione in caso di **Pazienti allergici gravi**

In caso di precedenti reazioni gravi al M.D.C., l'esame deve essere eseguito in presenza del medico Anestesista previo accordo con il Reparto di Rianimazione.