

*Gentile paziente,*

*Lei è affetto da una patologia della laringe che, non avendo risposto alle cure mediche, necessita di un ulteriore approfondimento diagnostico ed eventualmente di un trattamento chirurgico con una metodica che viene chiamata MICROLARINGOSCOPIA.*

*Le patologie della laringe causano in genere un calo di voce e, a volte, una sensazione di corpo estraneo in gola.*

*E' buona norma asportare qualsiasi lesione neofornata in modo da poterne definire la dignità istologica per prevenire l'insorgenza di patologie pericolose.*

*La microlaringoscopia è un fine intervento microchirurgico che viene eseguito in anestesia generale con un'apparecchiatura che il chirurgo introduce dalla bocca mentre il paziente è già anestetizzato.*

*Per informazioni dettagliate sulle possibili complicazioni dell'intervento consulti il consenso informato (<http://www.sacrocuoredoncalabria.it/attach/Content/Reperti/158/o/microlaringoscopia.pdf>).*

*Successivamente con o senza l'ausilio del laser, a seconda dei casi, la lesione viene asportata.*

*Al risveglio non si accusa alcun tipo di dolore, se non un lieve senso di fastidio alla gola di breve durata.*

*Dopo poche ore dal risveglio ci si sente assolutamente normali, ci si può alzare dal letto e, al mattino successivo si verrà dimessi.*

*Per evitare difficoltà di cicatrizzazione, a volte anche severe, che possono mettere a repentaglio il buon esito dell'intervento e quindi, anche la qualità della voce, è molto importante attenersi alle seguenti raccomandazioni:*

- *Non parlare per almeno 3 giorni, tranne che in casi di vera necessità e, in tal caso, non sussurrare ma parlare con voce normale.*
- *Non fumare per nessun motivo*
- *Eseguire le cure prescritte.*

*Per quanto riguarda l'alimentazione nella fase post-operatoria,, in genere, non ci sono particolari limitazioni.*

*La ripresa delle voce sarà graduale e dipenderà molto dal tipo di patologia trattata: in alcuni casi si assisterà ad una rapida normalizzazione, in altri potranno trascorrere diverse settimane o mesi.*

*Nei pazienti sottoposti all'intervento per lesioni sospette o neoplastiche è possibile che la voce dopo l'operazione non solo non migliori, ma addirittura peggiori, in quanto in tali casi l'obiettivo dell'intervento non è il miglioramento della voce ma la preservazione della vita.*