



**Mielolesioni primo ricovero: 39**

**Traumatiche: 14**

**Non traumatiche: 25**

	Maschi		Femmine	
N°	28		11	
Età media	57,07		54,36	
Gg degenza	106,14		72,00	
FIM ing	63,14		65,54	
FIM us	99,71		108,27	
ASIA	in	us	in	us
ASIA A	6	6	0	0
ASIA B	3	1	1	0
ASIA C	2	3	1	1
ASIA D	14	16	9	9
ASIA E	0	2		1
Livello motorio				
Cervicale	15	8	4	2
Dorso-lombo sacrale	13	20	7	9
Passaggio Via San Marco	7			

**Commenti**

Il report si riferisce al 90% dei pazienti dimessi nel 2015 catalogati come primo ricovero riabilitativo. Non sono quindi considerati i pazienti ricoverati per controllo, ulcere o altre patologie intercorrenti. La maggior presenza di maschi è in linea con ipotesi epidemiologica che vede i traumi più presenti nella componente maschile e con una maggior presenza di lesioni ASIA A cervicali in questo gruppo. Questo rende ragione anche del relativo minor recupero in termini di FIM motoria del gruppo maschile. I miglioramenti nelle autonomie motorie indicano inoltre (come del resto dimostra la scala ASIA) che le lesioni incomplete prevalgono sulle complete.