

Gentile paziente,

*Lei è affetto da una patologia che causa il blocco meccanico della catena di trasmissione del suono nell'orecchio, denominata OTOSCLEROSI.*

*Si tratta di una malattia, a volte familiare, di cui non sono note le cause e che provoca la formazione di un osso anomalo che può bloccare la staffa.*

*Il blocco del terzo ossicino dell'orecchio medio causa un arresto della trasmissione del suono all'orecchio interno, determinando una grave perdita di udito mono o bilaterale, a volte ronzii nelle orecchie e anche vertigini.*

*L'intervento di STAPEDOTOMIA consiste in una delicata procedura microchirurgica durante la quale viene sostituita la staffa boccata con una protesi definita “pistone” che può essere in materiale sintetico (TEFLON) o in metallo, per lo più TITANIO.*

*L'operazione viene eseguita in una breve anestesia generale, non prevede, in genere, tagli visibili ed è sostanzialmente indolore al risveglio.*

*Per informazioni dettagliate sulle possibili complicazioni dell'intervento consulti il consenso informato (<http://www.sacrocuoredoncalabria.it/attach/Content/Reparti/158/o/otosclerosi.pdf>).*

*Per lo più il ricovero è di una notte; al risveglio e nei primi giorni possono essere presenti lievi vertigini.*

*Alla dimissione l'orecchio è chiuso da un materiale spugnoso denominato MEROCEL che il paziente dovrà imbibire a casa con delle gocce prescritte in dimissione.*

*Il controllo andrà eseguito al microscopio dal chirurgo dopo 7-10 giorni e prevede la delicata asportazione del materiale di tamponamento, la verifica delle condizioni del lembo timpanomeatale e dei primi effetti sull'udito.*

*L'intervento di otosclerosi è in grado di fare recuperare l'udito perduto, tuttavia, trattandosi di una chirurgia estremamente delicata è molto importante attenersi alle seguenti indicazioni nella fase di convalescenza per non rischiare gravi complicazioni che possono giungere alla sordità completa dell'orecchio operato:*

- *È assolutamente da evitare il contatto dell'acqua con l'orecchio operato fino a diversa indicazione da parte del chirurgo*
- *È assolutamente proibito eseguire qualsiasi sforzo o attività fisica fino a diversa indicazione da parte del chirurgo*
- *È importante eseguire la terapia prescritta*
- *È vietato fumare*
- *È vietato andare in aereo o in alta montagna per almeno 2 mesi*

*La ripresa dell'udito verrà notata già alla prima medicazione, ma sarà valutabile al secondo controllo che va effettuato dopo circa 3-4 mesi.*

*Se dovesse essere necessario l'intervento anche a carico dell'altro orecchio occorrerà attendere almeno 6 mesi per programmarlo.*