

### TAMPONE VAGINALE /VULVOVAGINALE

L'esecuzione del tampone vaginale è necessaria per accertare l'eziologia microbica di una sospetta vaginite, rilevare una condizione di vaginosi o di dismicrobismo.

#### Indicazioni per la paziente:

- Non deve essere nel periodo mestruale o deve averlo terminato da almeno tre giorni
- Non assumere antibiotici nei 5 giorni che precedono l'esame
- Evitare rapporti sessuali nelle 24 ore precedenti l'esame
- Evitare irrigazioni vaginali, terapie locali (ovuli, candele...) e bagni in vasca nelle 24 ore precedenti
- Effettuare la detersione dei genitali esterni

#### Come si esegue:

Il tampone va effettuato presso l'ambulatorio del Centro prelievi

#### Come si prenota:

Prenotazione obbligatoria, tramite il link "[Prelievo senza coda](#)" scegliere "Prelievo per tamponi vaginali, rettali e uretrali"

#### Quando si esegue:

Consultare la sezione "[Modalità e orari di accesso](#)"

### TAMPONE VAGINO-RETTALE IN GRAVIDANZA

Il tampone vagino-rettale per le donne in gravidanza si esegue su indicazione del ginecologo intorno alla 35-36° settimana di gravidanza. Tale test è indicato per la ricerca dello *Streptococcus agalactiae* (streptococco beta emolitico di gruppo B), che durante il parto potrebbe causare infezioni al bambino (seguire le indicazioni per TAMPONE VAGINALE/VULVOVAGINALE).

#### Come si esegue:

Il tampone va effettuato presso i Poliambulatori

#### Come si prenota:

Prenotazione obbligatoria, tramite il link "[Prelievo senza coda](#)" scegliere "Prelievo per tamponi vaginali, rettali e uretrali"

#### Quando si esegue:

Consultare la sezione "[Modalità e orari di accesso](#)"

### TAMPONE URETRALE

Il tampone uretrale ha la finalità di individuare l'agente eziologico di uretrite.

Devono essere ricercati mediante biologia molecolare *Chlamydia trachomatis*, *Mycoplasma genitalium*, *Trichomonas vaginalis* e *Neisseria gonorrhoeae*.

Possono essere ricercati anche altri eventuali patogeni mediante esame batteriologico colturale.

#### Indicazioni per la paziente:

- Non deve essere nel periodo mestruale o deve averlo terminato da almeno tre giorni
- Non assumere antibiotici nei 5 giorni che precedono l'esame
- Evitare rapporti sessuali nelle 24 ore precedenti l'esame
- Evitare irrigazioni vaginali, terapie locali (ovuli, candele... ) e bagni in vasca nelle 24 ore precedenti
- Effettuare la detersione dei genitali esterni
- Il tampone deve essere effettuato ALMENO DOPO 3 ORE dall'ultima minzione

**Come si esegue:**

Il tampone va effettuato presso l'ambulatorio del Centro prelievi

**Come si prenota:**

Prenotazione obbligatoria, tramite il link "[Prelievo senza coda](#)" scegliere "Prelievo per tamponi vaginali, rettali e uretrali"

**Quando si esegue:**

Consultare la sezione "[Modalità e orari di accesso](#)"

**TAMPONE CERVICALE**

Il tampone cervicale è volto ad accertare la presenza *Chlamydia trachomatis*, *Mycoplasma genitalium*, *Trichomonas vaginalis* e *Neisseria gonorrhoeae*, mediante biologia molecolare, in donne che presentino segni di cervicite oppure che stiano seguendo indagini a scopo preventivo (gravidanza, infertilità, ecc...)

Possono essere ricercati anche altri eventuali patogeni mediante esame batteriologico colturale (seguire le indicazioni per TAMPONE VAGINALE).