

## **RACCOLTA DELLE FECI PER RICERCA DEL SANGUE OCCULTO**

### **Raccomandazioni per la buona riuscita del test**

La ricerca del **Sangue occulto** nelle feci viene eseguita mediante l'impiego di un test immunocromatografico che rileva l'emoglobina umana nativa (non degradata).

Tale metodologia non richiede restrizioni dietetiche di alcun tipo.

- Il test è finalizzato allo screening delle neoplasie coloretali e pertanto non deve essere impiegato per la determinazioni di sanguinamenti delle alte vie digestive (non rileva l'emoglobina degradata);
- La ricerca del sangue occulto nelle feci è sconsigliata in corso di:
  - malattie terminali;
  - malattie infiammatorie croniche dell'intestino;
  - recenti indagini endoscopiche (in particolare coloretale);
- si consiglia la sospensione di farmaci potenzialmente lesivi della mucosa intestinale (FANS, corticosteroidi) per evitare microsanguinamenti iatrogeni;
- **non eseguire il test in corso di mestruazioni;**
- non eseguire il test in corso di macrosanguinamenti (es. presenza di emorroidi sanguinanti)
- non eseguire coprocultura od esame parassitologico sul campione raccolto per il sangue occulto.

**L'Utente deve approvvigionarsi del contenitore idoneo per la raccolta del campione in Farmacia oppure gratuitamente presso il Centro Prelievi .Tale contenitore consente la conservazione a temperatura ambiente per 3 giorni od in frigorifero (2-10 °C) per 7 giorni.**

### **Istruzioni per la raccolta:**

- Scrivere sull'etichetta del flacone i dati richiesti e la data del prelievo di campione;
- Raccogliere le feci in un contenitore pulito e asciutto o disporre più strati di carta igienica all'interno del W.C. per trattenere le feci; **evitare la contaminazione con urine**
- Svitare il tappo ed estrarre l'asticella dal flacone facendo attenzione a non sversare il liquido presente, è un tampone di conservazione dell'emoglobina;
- Immergere l'asticella nelle feci in 5-6 punti diversi; prediligere zone di feci disomogenee per aspetto o colore oppure in cui si notino muco e/o strie di sangue;
- Reinserire l'asticella nel flacone, riavvitare saldamente il tappo, agitare e conservare in frigorifero (2° - 8° C) fino alla consegna presso il Centro Prelievi.
- Per consegne differite di qualche giorno, conservare il flacone in frigorifero (2-10°C).