


Morso di zecca

Cosa deve sapere un operatore sanitario

COME RIMUOVERE LA ZECCA


- **Rimuovere la zecca con una pinzetta applicando una trazione verso l'alto**
- **Durante la rimozione avere cura di non premere il corpo**
- **Non applicare nessun solvente**
- Successivamente disinfettare l'area
- Nel caso in cui la testa (rostro) rimanga nella pelle si può provare a rimuoverlo con un ago sterile. Tuttavia, questo non contiene il germe e verrà espulso spontaneamente nei giorni successivi.



IDENTIFICAZIONI ZECCA E RISCHIO EPIDEMIOLOGICO

Ai fini epidemiologici:

- **Conservare la zecca** in un contenitore pulito con tappo a vite
- **Compilare impegnativa** con codice CVP: 91.04.5_2
- **Annotare l'area geografica** (paese, provincia, Regione) in cui è avvenuto il morso di zecca
- **Annotare il giorno** in cui è stata rimossa la zecca e, in caso di incertezza, il periodo in cui più probabilmente è avvenuta l'esposizione in area a rischio (passeggiata, o altra attività in area boschiva)
- Per la **consegna campione** presso IRCCS Ospedale Sacro Cuore Don Calabria: è possibile prenotare dal sito Sacrocuore.it "prelievo zero coda-consegna campione", oppure recandosi direttamente al 6° piano Don Calabria tutte le mattine dal lunedì a venerdì h.9-13. Durante l'accettazione verrà consegnato un modulo da compilare in loco e riconsegnare assieme al campione campione.



MONITORARE IL PAZIENTE PER 6 SETTIMANE

Consigliare al paziente di monitorare **quotidianamente** l'area in cui è avvenuto il morso di zecca per almeno 6 settimane.

La flogosi cutanea occasionalmente presente nella sede del morso di zecca non necessita di alcuna terapia in quanto regredisce 1-2 giorni dopo la rimozione.

Nel caso in cui non si manifesti alcun disturbo non è necessario effettuare ulteriori indagini, in particolare non è indicato il prelievo ematico per l'esame sierologico.

Richiedere valutazione infettivologica tramite impegnativa urgente/breve

(dal lunedì al venerdì h9-13) in caso di comparsa entro 6 settimane dal morso di:

- eruzione cutanea circolare che si allarga nei giorni successivi (>5 cm di diametro)
- febbre con temperatura superiore ai 37.8°C
- dolori muscolari o articolari diffusi (simil influenzali)
- stanchezza intensa
- cefalea intensa e persistente, tremori, vertigine, formicolii alle braccia o alle gambe, confusione