

CHIRURGIA DELLE OCCLUSIONI ARTERIOSE DELL'AORTA ADDOMINALE, AORTO-ILIACHE E DELLE ARTERIE DEGLI ARTI INFERIORI

L'**arteriopatia obliterante cronica periferica** (AOCP) è una condizione medica determinata dalla formazione di placche aterosclerotiche che causano il progressivo restringimento, fino alla occlusione completa, del lume dei principali vasi arteriosi addominali e/o degli arti inferiori.

La sintomatologia tipica di tali quadri può andare dalla *claudicatio intermittens* (dolore crampiforme durante la deambulazione con necessità di interruzione della marcia) fino all'ischemia critica o acuta.

Gli **interventi chirurgici** eseguiti comprendono:

- Bypass aorto-aortico, aorto-bisiliaco o bypass aorto-bifemorale
- Bypass aorto mesenterici e/o aorto renale
- Endoarterectomia aorto-iliaca
- Trattamento endovascolare aorto-iliaco mediante angioplastica e stenting
- Bypass femoro-poplitei sopra- o sotto-genicolari
- Bypass extra-anatomici
- Bypass carotido-succlavio
- Ricanalizzazione endovascolare femoro-poplitea




FIGURA 5

Esempi di rivascularizzazione d'arto inferiore mediante bypass femoro-popliteo in vena.

